

Where to Get Tested?
¿En dónde hacerse la prueba?


New York City / Ciudad de Nueva York

Bronx

Hispanic AIDS Forum
886 Westchester Avenue
Bronx, NY 10459
(718) 328-4188

Promesa, Inc
1776 Clay Ave, 1st Floor
Bronx, NY 10457
(718) 299-1100

Urban Health Plan
1065 Southern Blvd.
Bronx, NY 10459
(718) 991-4833

Brooklyn

Brooklyn Hospital Center
121 Dekalb Avenue,
Brooklyn, NY 11201
(718) 940-5930

Wycoff Heights Medical Center
342 Stanhope Street
Brooklyn, NY 11237
(718) 302-8483

Manhattan

Alianza Dominicana
2310 Amsterdam Avenue
New York, NY 10033
(212) 927-6810

Betances Health Center
280 Henry Street
New York, NY 10002
(212) 227-8401 ext. 182

Borinken Neighborhood Health Center
2253 Third Ave, 3rd Floor
New York, NY 10035
(212) 289-6650

Hispanic AIDS Forum
213 W 35th Street, 12 Floor
New York, NY 10001
(212) 563-4500

Queens

AIDS Center of Queens County
97-45 Queens Blvd. 12th Fl.
Rego Park, NY 11374
(718) 896-2500
175-61 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
(718) 739-2525

Hispanic AIDS Forum
62-07 Woodside Ave. 3rd Fl
Woodside, NY 11377
(718) 803-2766

Voces Latinas
43-22 50th Street 2nd floor
Woodside, NY 11377
(718) 593-4528

Staten Island

El Centro de Hospitalidad
1546 Castleton Avenue
Staten Island, NY 10302
(718) 428-6466

Project Hospitality Shine Center
150B Richmond Terrace
Staten Island, NY 10301
(718) 876-7716

Long Island

Nassau County

Círculo de la Hispanidad
91 North Franklin Street
Hempstead, NY 11550
(516) 292-2433

NYS Department of Health
250 Fulton Avenue
Hempstead, NY 11550
(800) 462-6785

Suffolk County

County Building
15 Horseblock Place, 1st Floor
Farmingville, NY 11738
(800) 462-6786

Tri-Community Center
1080 Sunrise Highway
Amityville, NY 11701
(800) 462-6786

Upstate New York

Amsterdam

Amsterdam Memorial Hospital
Family Health Center
4988 State Highway 30
Amsterdam, NY 12010
(518) 841-3770

Buffalo

Hispanos Unidos de Buffalo
254 Virginia Street
Buffalo, NY 14201
(716) 856-7110

Rochester

STD Clinic
855 West Main Street
Rochester, NY 14611
(585) 464-5928



**LOVE LIFE:
GET TESTED**

**AMA LA VIDA:
HAZTE LA
PRUEBA**

A Bilingual HIV Testing
Resource Guide

Guía bilingüe de recursos para
hacerse la prueba del VIH

Funding for this publication was made possible
by the New York State AIDS Institute.

This publication is developed by:



hispanicfederation





Why Get Tested?

If you have ever had sex with a man or a woman without a condom, or have ever injected drugs (even if only once), the only sure way to know if you are infected with HIV or not is to take the test. Knowing your HIV status, whether negative or positive, empowers you to better protect yourself and those you love. People who test negative and don't have HIV can learn more about ways to reduce their risk. Those who test positive for the virus can access life-saving treatment and learn how they can stop the spread of HIV/AIDS.



About the Test

Rapid HIV testing can be done on a drop of blood from a fingerstick or an oral fluid specimen gathered by swiping a cotton swab on the inside of the mouth. Rapid oral and blood tests are very accurate and results are available in less than 30 minutes.

Standard HIV testing can also be conducted by collecting blood or oral fluid specimens. Standard HIV tests are sent to a laboratory for analysis and results are generally available in 1-2 weeks.

A negative test means that no HIV was detected. If a rapid test is reactive, a second standard test will be collected to confirm whether or not HIV was detected.

Love Life: Get Tested. There is no reason to wait; getting a test is easy, painless, confidential and free of charge.



Facts You Should Know

- ➔ More than 100,000 New Yorkers are living with HIV. Nearly one-third (32%) of these individuals are of Hispanic/Latino descent.
- ➔ As many as 1 in 4 individuals who are HIV positive don't know they're infected.
- ➔ Almost 40% of new Latina women infections occur through heterosexual contact (sexual activity with a man). The rate of HIV infection among Hispanic women is 13 times higher than white women in New York.
- ➔ Latino men are 4 times more likely to die of AIDS than white men.
- ➔ Hispanic teens represent more than one in five (21%) of the new AIDS cases reported among teens (ages 13-19).



¿Por qué hacerse la prueba?

Si alguna vez has tenido relaciones sexuales con un hombre o mujer y no has utilizado condón, o te has inyectado drogas (aunque haya sido una sola vez), la única forma de estar seguro si estás o no contagiado con el VIH, es haciéndote la prueba. El conocer tu estatus de VIH, sea este positivo o negativo, te permite proteger tu salud y la de tus seres queridos. Las personas cuyos resultados son negativos y no están contagiadas por el VIH, pueden aprender cómo reducir el riesgo de contagio. Aquellos individuos cuyos resultados son positivos con el virus, aprenderán a detener la propagación del VIH/SIDA y podrán tener acceso a tratamientos que salvarán o prolongarán su vida.



Sobre la prueba

La prueba rápida del VIH puede realizarse colocando un algodón en el interior de la boca o tomando una gota de sangre de un dedo. Las pruebas orales y sanguíneas son más exactas y los resultados se obtienen en menos de 30 minutos.

La prueba estándar de VIH también puede realizarse obteniendo una muestra de sangre o de fluidos orales. Este tipo de pruebas son enviadas al laboratorio para su análisis y los resultados se obtienen en una o dos semanas.

Un resultado negativo significa que el virus del VIH no ha sido detectado. Si la prueba rápida reacciona positivamente una prueba estándar se realizará para confirmar si el virus es o no detectado.

Ama la vida: hazte la prueba. No hay razón para esperar. Hacerse la prueba es fácil, sin dolor, confidencial y gratis.



Realidades que debes conocer

- ➔ Más de 100,000 neoyorquinos viven contagiados con el VIH. Cerca de un tercio (32%) de estos casos, son de descendencia hispana.
- ➔ Alrededor de 1 de cada 4 personas infectadas con el VIH no sabe que está contagiada.
- ➔ Alrededor del 40% de las nuevas infecciones en mujeres latinas ocurren por contactos heterosexuales (actividad sexual con un hombre). La tasa de infección de VIH entre las mujeres hispanas es 13 veces mayor que el de las mujeres de raza blanca en Nueva York.
- ➔ Los hombres latinos son 4 veces más propensos a morir por SIDA que los hombres de raza blanca.
- ➔ Los adolescentes hispanos representan el 21% o uno de cada cinco casos de SIDA reportados de jóvenes entre los 13 y 19 años de edad.

www.latinohivtesting.org

For more information:
Para mayor información:

Hispanic Federation (866) 432-9832
Latino Commission on AIDS (212) 675-3288